



# Signos tempranos de parálisis cerebral



Piense en estos signos como pistas: Encontrar una o más de estas pistas no significa que su hijo definitivamente tenga parálisis cerebral (PC). Por otro lado, su hijo no necesita tener todas las pistas para ser diagnosticado con PC. Solo un médico puede diagnosticar a su hijo con PC. Si nota alguno de los primeros signos que se enumeran a continuación, hable con el médico de su hijo.

Si su hijo nació más de 3 semanas antes, tendrá que "ajustar" su edad para determinar que hitos buscar.

A. Su bebé tiene \_\_\_\_ meses de edad

B. Nació su bebé \_\_\_\_ Meses temprano

C. La edad ajustada de su bebé es \_\_\_\_ meses (A - B)

**Pista # 1: Su hijo no alcanza los hitos motores a las edades esperadas.**

**A los 2 meses, el niño no:**



- Mantenga la cabeza erguida cuando en su
- barriga mueva ambos brazos y ambas piernas
- abrir sus manos

**A los 4 meses, el niño no:**



- Mantenga su cabeza firme sin apoyo cuando se sostenga
- sostenga un juguete cuando lo ponga en su mano
- usar sus brazos para golpear o golpear a los
- juguetes llevar sus manos a su boca
- empujar hacia arriba sobre sus codos cuando en su barriga
- mantener sus manos abiertas

**A los 6 meses, el niño no:**



- Rollo de la barriga a la espalda
- empujar hacia arriba con los brazos rectos cuando está
- boca abajo apoyarse en sus manos para apoyarse cuando está sentado
- recoger objetos pequeños rastrillando con los dedos
- recoger objetos pequeños con cualquiera de las manos

**Pista # 2: Los músculos de su hijo se sienten inusuales.**

El cuerpo de su hijo puede sentirse rígido, con músculos tensos o tenso. O bien, el cuerpo de su hijo puede sentirse flácido, con músculos sueltos o blandos.

**Pista # 3: Su hijo no usa los dos lados de su cuerpo de la misma manera.**

Es posible que su hijo prefiera usar un lado de su cuerpo más que el otro. Por ejemplo, siempre pueden alcanzar con su mano derecha. Puede notar que una mano o un pie están apretados mientras que la otra está relajada.

**Pista #4: Su hijo muestra los siguientes patrones de movimiento inusuales.**

- Su hijo puede arquear la espalda y el cuello cuando se sostiene, alejándose de usted.
- Las piernas de su hijo pueden ponerse rígidas y cruzadas cuando las levantan.

**Pista #5: Su hijo tiene dificultades significativas con la alimentación**

Es posible que su hijo no pueda succionar bien un pezón, o puede tener arcadas, ahogarse o toser con frecuencia.