



# Early Signs of Cerebral Palsy



Think of these signs like clues: Finding one or more of these clues does not mean your child definitely has cerebral palsy (CP). On the other hand, your child does not need to have all of the clues to be diagnosed with CP. Only a doctor can diagnose your child with CP. If you notice any of the early signs listed below, talk to your child's doctor.

If your child was born more than 3 weeks early, you will need to "adjust" their age to determine which milestones to look for.

A. Your baby is \_\_\_\_\_ months old

B. Your baby was born \_\_\_\_\_ months early

C. Your baby's adjusted age is \_\_\_\_\_ months (A - B)

**Clue #1: Your child does not achieve motor milestones at the expected ages.**

**At 2 months, child does not:**



- hold their head up when on their tummy
- move both arms and both legs
- open their hands

**At 4 months, child does not:**



- hold their head steady without support when held
- hold a toy when you put it in their hand
- use their arms to swat or bat at toys
- bring their hands to their mouth
- push up onto their elbows when on their tummy
- hold their hands open

**At 6 months, child does not:**



- roll from tummy to back
- push up with straight arms when on their tummy
- lean on their hands for support when sitting
- pick up small objects by raking with their fingers
- pick up small objects with either hand

**Clue #2: Your child's muscles feel unusual.**

Your child's body may feel stiff, with muscles that are tight or tense. Or, your child's body may feel floppy, with muscles that are loose or soft.

**Clue #3: Your child does not use the two sides of their body in the same way.**

Your child may prefer to use one side of their body more than the other. For example, they may always reach with their right hand. You may notice that one hand or foot is clenched while the other is relaxed.

**Clue #4: Your child shows the following unusual movement patterns.**

- Your child may arch their back and neck when held, pushing away from you.
- Your child's legs may get stiff and cross when they are picked up.

**Clue #5: Your child has significant difficulties with feeding.**

Your child may not be able to suck well on a nipple, or may gag, choke, or cough often.



# Signos tempranos de parálisis cerebral



Piense en estos signos como pistas: Encontrar una o más de estas pistas no significa que su hijo definitivamente tenga parálisis cerebral (PC). Por otro lado, su hijo no necesita tener todas las pistas para ser diagnosticado con PC. Solo un médico puede diagnosticar a su hijo con PC. Si nota alguno de los primeros signos que se enumeran a continuación, hable con el médico de su hijo.

Si su hijo nació más de 3 semanas antes, tendrá que "ajustar" su edad para determinar que hitos buscar.

A. Su bebé tiene \_\_\_\_ meses de edad

B. Nació su bebé \_\_\_\_ Meses temprano

C. La edad ajustada de su bebé es \_\_\_\_ meses (A - B)

**Pista # 1: Su hijo no alcanza los hitos motores a las edades esperadas.**

**A los 2 meses, el niño no:**



- Mantenga la cabeza erguida cuando en su
- barriga mueva ambos brazos y ambas piernas
- abrir sus manos

**A los 4 meses, el niño no:**



- Mantenga su cabeza firme sin apoyo cuando se sostenga
- sostenga un juguete cuando lo ponga en su mano
- usar sus brazos para golpear o golpear a los
- juguetes llevar sus manos a su boca
- empujar hacia arriba sobre sus codos cuando en su barriga
- mantener sus manos abiertas

**A los 6 meses, el niño no:**



- Rollo de la barriga a la espalda
- empujar hacia arriba con los brazos rectos cuando está
- boca abajo apoyarse en sus manos para apoyarse cuando está sentado
- recoger objetos pequeños rastrillando con los dedos
- recoger objetos pequeños con cualquiera de las manos

**Pista # 2: Los músculos de su hijo se sienten inusuales.**

El cuerpo de su hijo puede sentirse rígido, con músculos tensos o tenso. O bien, el cuerpo de su hijo puede sentirse flácido, con músculos sueltos o blandos.

**Pista # 3: Su hijo no usa los dos lados de su cuerpo de la misma manera.**

Es posible que su hijo prefiera usar un lado de su cuerpo más que el otro. Por ejemplo, siempre pueden alcanzar con su mano derecha. Puede notar que una mano o un pie están apretados mientras que la otra está relajada.

**Pista #4: Su hijo muestra los siguientes patrones de movimiento inusuales.**

- Su hijo puede arquear la espalda y el cuello cuando se sostiene, alejándose de usted.
- Las piernas de su hijo pueden ponerse rígidas y cruzadas cuando las levantan.

**Pista #5: Su hijo tiene dificultades significativas con la alimentación**

Es posible que su hijo no pueda succionar bien un pezón, o puede tener arcadas, ahogarse o toser con frecuencia.